

No	04007	レジメン名	BEV+TMZ+RT(初発、維持療法)【点滴】		クール	放射線併用期:BEV+TMZ+RT(6週間)											
領域	脳神経	対象	悪性神経膠腫		サイクル	維持療法期:BEV+TMZ(28日×6) 単剤療法期:BEV(21日×PDまで)											
【放射線併用期 6週間(下記14日×3)、注)BEV6週終了翌日に4回目を入れる】																	
					投与日												
抗がん剤	商品名	投与量	単位	投与法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14		
1	BEV	アバステン	10	mg/kg	DIV	day	●										
2	TMZ	テモダール	75	mg/m ²	DIV	day	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
(3)	RT	放射線															
【休薬期間 4週間】																	
【維持療法期 24週間(下記28日×6)】																	
					投与日												
抗がん剤	商品名	投与量	単位	投与法	1	2	3	4	5	6	7	...	14	15	16	...	28
1	BEV	アバステン	10	mg/kg	DIV	day	●							●			
2	TMZ	テモダール	下記参照	mg/m ²	DIV	day	●	●	●	●	●						
投与量:「1サイクル目に150mg/m ² /日を投与し忍容性が確認された場合、2サイクル目以降を200mg/m ² /日に増量」																	
【単剤療法期 21日×PDまで】																	
					投与日												
抗がん剤	商品名	投与量	単位	投与法	1	2	3	4	5	6	7	8	19	20	21	
1	BEV	アバステン	15	mg/kg	DIV	day	●										

レジメン