

No	04004	レジメン名	BEV+TMZ+RT(初発、維持療法)			クール	放射線併用期:BEV+TMZ+RT(6週間)														
領域	脳神経	対象	悪性神経膠腫			サイクル	維持療法期:BEV+TMZ(28日×6) 単剤療法期:BEV(21日×PDまで)														
【放射線併用期 6週間(下記14日×3)、注)BEV6週終了翌日に4回目を入れる】																					
抗がん剤					商品名					投与量		単位		投与法		投与日					
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… 14					
1	BEV	アバステチン	10	mg/kg	DIV	day	●														
2	TMZ	テモゾロミド	75	mg/m ²	p.o.	day	← ← ← ← ← ← ← ← 連日服用 → → → → → → → →														
(3)	RT	放射線																			
【休薬期間 4週間】																					
【維持療法期 24週間(下記28日×6)】																					
抗がん剤					商品名					投与量		単位		投与法		投与日					
																1 2 3 4 5 6 7 … 14 15 16 … 28					
1	BEV	アバステチン	10	mg/kg	DIV	day	●						●								
2	TMZ	テモゾロミド	下記参照	mg/m ²	p.o.	day	day1~5の5日間服用														
投与量:「1サイクル目に150mg/m ² /日を投与し忍容性が確認された場合、2サイクル目以降を200mg/m ² /日に増量」																					
【単剤療法期 21日×PDまで】																					
抗がん剤					商品名					投与量		単位		投与法		投与日					
																1 2 3 4 5 6 7 8 …… 19 20 21					
1	BEV	アバステチン	15	mg/kg	DIV	day	●														

レジメン